

滑川町内の放射線量測定結果

平成30年4月6日(金曜日)測定結果と年間換算値

気象条件(09:00分現在) 風:北北西1.2m 気温:13.5°C 湿度:73.1%

	測定場所	地点	天候 測定時刻	測定値(マイクロシーベルト/時間)			年間換算値 (ミリシーベルト/年)	備考
				地表0cm	地表50cm	地表100cm		
1	滑川幼稚園	園庭中央	曇り	0.054	0.041	-	0.28	
			11:03	(0.037)	(0.045)		(0.24)	
2	福田小学校	校庭中央	曇り	0.089	0.076	-	0.47	
			11:32	(0.085)	(0.084)		(0.45)	
3	宮前小学校	校庭中央	曇り	0.042	0.037	-	0.22	
			10:55	(0.034)	(0.044)		(0.23)	
4	月の輪小学校	校庭中央	曇り	0.081	0.082	-	0.43	
			10:20	(0.083)	(0.084)		(0.44)	
5	滑川中学校	校庭中央	曇り	0.064	-	0.057	0.34	
			10:48	(0.056)		(0.054)	(0.29)	
6	役場庁舎	屋上 (コンクリート)	曇り	0.049	-	0.038	0.26	
			9:15	(0.049)		(0.041)	(0.26)	
7	役場庁舎 南側庭	芝生	曇り	0.059	-	0.061	0.32	
			9:20	(0.059)		(0.042)	(0.31)	
8	総合グラウンド	グラウンド中央	曇り	0.046	-	0.045	0.24	
			9:38	(0.050)		(0.040)	(0.26)	
9	土塩球場	内野グラウンド	曇り	0.049	-	0.042	0.26	
			9:55	(0.048)		(0.045)	(0.25)	
10	月輪球場	バックネット裏	曇り	0.050	-	0.036	0.26	
			10:38	(0.054)		(0.045)	(0.28)	
11	都第一公園	内野グラウンド	曇り	0.040	-	0.038	0.21	
			10:22	(0.061)		(0.054)	(0.32)	
12	総合運動公園 子供ふれ あい広場	すべり台脇	曇り	0.089	0.063	-	0.47	
			9:30	(0.057)	(0.045)		(0.30)	

※平成27年度から東武グラウンドの測定を中止しました。

※()の中は前回測定(12月20日)の数値となります。

測定方法・測定機器は、以下のとおりです。

測定方法 : 町職員による簡易測定とし、1分経過後から10秒ごとに5回測定した平均値(小数点第4位四捨五入)

年間換算値: それぞれのポイントの最大測定値を採用

測定機器名 : 株堀場製作所 放射線監視モニタPA-1000 Radi

《年間放射線量の換算値計算方法》

$$\{ (\text{測定値} \times 8\text{時間} [\text{屋外にいる時間}]) + (\text{測定値} \times 0.4[\text{屋内での放射線の低減率}] \times 16\text{時間} [\text{屋内にいる時間}]) \} \times 365\text{日} \div 1000 \text{《単位をミリシーベルトに直すため》} = \text{年間換算値(ミリシーベルト/年)}$$

計算例: 滑川幼稚園地表0cmの場合 $\{ (0.054 \times 8) + (0.054 \times 0.4 \times 16) \} \times 365 \div 1000 = 0.28 \text{ミリシーベルト/年}$

測定値について

- ・測定値には、自然放射線量も含まれています。
- ・天候、地質、地表面の降下物、コンクリート製建物などに存在する放射性物質の影響を受けることがあります。
- ・埼玉県などの測定値と異なりますが、測定高、風向き、測定器などの違いによるものと考えられます。
- ・1ミリシーベルト=1000マイクロシーベルト